

グラナテック[®]点眼液0.4% を使用される患者さんへ

監修

熊本大学医学部附属病院 病院長 谷原 秀信 先生
高知大学医学部 眼科学講座 教授 福島 敦樹 先生

このお薬は、『緑内障、高眼圧症』の患者さんの眼圧を下げるお薬です。
1回1滴、1日2回点眼してください。



点眼方法

1 容器の先が目やまつ毛に触れないように、点眼してください。




2 点眼後は、目を軽く閉じて、1～5分間目頭の下を指で押さえてください。



3 点眼後、目のまわりについてのお薬を洗顔で洗い流すか、ぬらしたティッシュなどで“やさしく”ふき取ってください。




4 他の目薬を使用する時は、5分以上の間隔をあけてから点眼してください。



※ソフトコンタクトレンズを装着している場合は外してから点眼してください。

充血について

- このお薬は、一時的に血管を広げる作用があり、多くの方で、点眼後まもなく目が赤くなります(充血)。
- 通常、この充血は1～2時間でもとに戻り、点眼ごとに繰り返します。



点眼後5～15分が目の赤さのピークです。



※外出時の充血が気になる方は、外出時間を考えて早めに点眼するとよいでしょう。

以下のような場合は、医師又は薬剤師にご相談ください。

次の点眼までに充血が消えない場合や、以下の症状が続く場合は、医師または薬剤師にご相談ください。



充血が消えない



目のかゆみ



まぶたの赤み

保存方法 使用後は、ふたを閉め、直射日光を避けて、室温(1～30℃)で保存してください。